ГЕРБИЦИДЫ

Октапон экстра, КЭ

500 г/л 2,4-Д в виде малолетучих эфиров С7-С9, 20л

Культура - *Пшеница озимая, рожь, пшеница яровая, ячмень, кукуруза*

Вредные объекты - *Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки*

Норма применения препарата	Культура, обрабатываемый объект	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных работ)
0,6-0,8	Пшеница озимая, рожь	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов рано весной в фазе кущения культуры. Расход рабочей жидкости - 50-150 л/га	60(1)	-(3)
0,6-0,8	Пшеница яровая, ячмень		Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры. Расход рабочей жидкости - 50-150 л/га	60(1)	-(3)
0,6-0,75	Кукуруза		Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 50-150 л/га	60(1)	-(3)
0,6-0,8	Тимофеевка луговая, райграс высокий, овсяница луговая		Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев до выхода в трубку. Расход рабочей жидкости - 50-150 л/га	-(1)	-(3)
0,4-0,8	Ежа сборная, кострец безостый, лисохвост луговой		Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры. Расход рабочей жидкости - 50-150 л/га	-(1)	-(3)