ГЕРБИЦИДЫ

Риманол, ВДГ

римсульфурон, 250 г/кг, 0,5кг

Культура - *Кукуруза*

Вредные объекты - *Однолетние злаковые и двудольные сорняки, многолетние (пырей)*

Норма применения препарата	Культура, обрабатываемый объект	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных работ)
0,04	Кукуруза	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков в смеси с 200 мл/га ПАВ Дар-90, Ж. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)
0,05	Кукуруза	Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры при высоте злаковых сорняков 10-15 см и в фазе розетки осотов в смеси с 200 мл/га ПАВ Дар-90, Ж. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)
0,03+0,02	Кукуруза	Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры. Двукратное дробное опрыскивание по первой и второй волне сорняков (интервал 10-20 дней) в смеси с 200 мл/га ПАВ Дар-90, Ж. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)
0,05	Картофель	Многолетние (пырей ползучий), однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	Опрыскивание посадок после окучивания в ранние фазы развития (1-4 листа) однолетних сорняков и при высоте пырея 10-15 см в смеси с 200 мл/га ПАВ Дар-90, Ж. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	50(1)	-(3)
0,03+0,02	Картофель		Опрыскивание посадок после окучивания по первой волне и повторно по второй волне сорняков, при высоте пырея 10-15 см в смеси с 200 мл/га ПАВ Дар-90, Ж (отдельно для каждой обработки). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	50(2)	-(3)