ГЕРБИЦИДЫ

Рондо/Легат, КЭ

240г/л клетодима, 5л

Культура - *Свекла сахарная, соя, подсолнечник, лук*

Вредные объекты - *Однолетние, многолетние злаковые (пырей ползучий) сорняки*

Норма применения препарата	Культура, обрабатываемый объект	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных работ)
0,2-0,4	Свекла сахарная и кормовая, подсолнечник, соя	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев у сорняков независимо от фазы развития культуры совместно с Хелпер, КС (ПАВ) 0,6-1,2 л/га. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60(1)	-(3)
0,2-0,4	Лен- долгунец	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев у сорняков независимо от фазы развития культуры совместно с Хелпер, КС (ПАВ) 0,6-1,2 л/га. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	-(1)	-(3)
0,7-1	Свекла сахарная и кормовая, подсолнечник, соя	Многолетние злаковые сорняки (пырей ползучий)	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-20 см независимо от фазы развития культуры совместно с Хелпер, КС (ПАВ) 2,1-3,0 л/га. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60(1)	-(3)
0,7-1	Лен долгунец	Многолетние злаковые сорняки (пырей ползучий)	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-20 см независимо от фазы развития культуры совместно с Хелпер, КС (ПАВ) 2,1-3,0 л/га. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	-(1)	-(3)