ГЕРБИЦИДЫ

Сотейра, ВРК

33 г/л имазамокса+ 15 имазапира, 5л

Культура - *Подсолнечник*

Вредные объекты - *Двудольные и злаковые сорняки, в том числе – заразиха*

Норма применения препарата	Культура, обрабатываемый объект	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных работ)
1-1,2	Подсолнечник (сорта и гибриды, устойчивые к имидазолинонам)	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (2-4 листьев) и 4-5 настоящих листьев у культуры. Ограничения по севообороту: можно высевать пшеницу, рожь не менее, чем через 4 месяца; люцерну, сою, ячмень, овес, кукурузу, горох-через 9 месяцев. Картофель, томаты, табак, лук, просо, салат, подсолнечник, огурцы, морковь можно высевать через 19 месяцев, сахарную и столовую свеклу, рапс – через 26 месяцев. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60(1)	-(3)
2	Земли несесельскохозяйственного назначения	Борщевик Сосновского	Опрыскивание участков засоренных борщевиком Сосновского при его высоте 10-15 см. Расход рабочей жидкости – 300 л/га		
2	Земли несесельскохозяйственного назначения	Амброзия полыннолистная	Опрыскивание участков засоренных амброзией полыннолистной в фазу всходов и до высоты 10-15 см. Расход рабочей жидкости – 300 л/га		