ГЕРБИЦИДЫ

Элант Экстра, СЭ

410г/л 2,4-Д кислоты+7,4 г/л флорасулама, 10л

Культура - *Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой*

Вредные объекты - *Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА*

Норма применения препарата	Культура, обрабатываемый объект	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных работ)
0,3-0,5	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	Однолетние двудольные (в т. ч. подмаренник цепкий и устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х-кислотам) и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Озимые обрабатываются весной. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га	60(1)	-(-)
0,5	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой		Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорняков (с учетом чувствительности сортов) в случае преобладания подмаренника цепкого; если погодные условия не позволили произвести обработку раньше срока. Озимые обрабатывают весной. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га		
0,3-0,5	Кукуруза (в том числе на силос и масло)	Однолетние двудольные (в т. ч. подмаренник цепкий и устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х-кислотам)	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га		
0,3-0,5	Просо		Опрыскивание посевов в фазе 3-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га		
0,3-0,5	Сорго		Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га		