НЕСЕЛЕКТИВНЫЕ ГЕРБИЦИДЫ

Зеро, ВР

360 г/л глифосата кислоты, 20л

Культура - *Пары*

Вредные объекты - *Злостные многолетние (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой и др.) сорняки*

Норма применения препарата	Культура, обрабатываемый объект	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных работ)
2-4	Плодовые, цитрусовые культуры, виноградники	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом (при условии защиты культуры). Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(3)
4-8	Плодовые, цитрусовые культуры	Многолетние злаковые и двудольные сорняки			
4	Виноградники	Многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание многолетних злаковых и двудольных вегетирующих сорняков в мае-июле (при условии защиты культуры). Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га		
2-4	Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, технические, масличные, бахчевые), а также однолетних цветочных (семенные посевы)	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га		
4-6		Многолетние злаковые и двудольные сорняки			
6-8		Злостные многолетние (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой и др.) сорняки			
2-4	Пары	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га		
4-6		Многолетние злаковые и двудольные сорняки			
6-8		Злостные многолетние (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой и др.) сорняки			

НЕСЕЛЕКТИВНЫЕ ГЕРБИЦИДЫ

Зеро, ВР

360 г/л глифосата кислоты, 20л

Культура - *Пары*

Вредные объекты - *Злостные многолетние (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой и др.) сорняки*

Норма применения препарата	Культура, обрабатываемый объект	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных работ)
4-8	Поля, предназначенные под семенные посевы многолетних злаковых трав	Многолетние, однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков в послеуборочный период или весной за 2-4 недели до посева трав. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(3)
3-8	Паровые поля лесных питомников		Опрыскивание вегетирующих сорняков. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га		
3-8	Посадки и посевы сосны, ели и кедра в питомниках		Опрыскивание вегетирующих сорняков после окончания роста сеянцев и саженцев. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га		
0,55-1,1 мл/дерево	Лиственные, лиственно-хвойные молодняки и средневозрастные древостои	Лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ольха, ива и др.)	Инъекция в стволы деревьев нежелательных пород в период вегетации при регулировании состава и густоты древостоев или их реконструкции		
4,2-8,3 мл/дерево	Смешанные приспевающие и спелые древостои	Осина	Инъекция в стволы деревьев в период вегетации для предотвращения порослеобразования и содействия естественному возобновлению ценных пород (в спелых древостоях проводится перед сплошной рубкой главного пользования)		
3-6	Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и др. промышленные территории)	Все виды нежелательных травянистых растений (за исключением относительно устойчивых вейника, тростника и других), лиственные древесно-кустарнико-вые породы (осина, береза, ольха)	Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га. Запрещается пребывание людей на обработанных территориях, в т.ч. для сбора ягод и грибов, в течение 15 дней		