ИНСЕКТИЦИДЫ

Ципи, КЭ

(250 г/л циперметрина), 5л

Культура - *Пшеница, Картофель*

Вредные объекты - *Клоп вредная черепашка, злаковая тля, клопик пьявица, блошки, хлебные трипсы*

Норма применения препарата	Культура, обрабатываемый объект	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных работ)
0,32	Кукуруза (кроме кукурузы на масло)	Хлопковая совка	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	38(2)	7(3)
0,15		Кукурузный мотылек		38(2)	7(3)
0,2	Пшеница	Злаковая тля, клопики, пьявицы, блошки, пшеничный трипс, клоп вредная черепашка		43(2)	7(3)
0,4	Свекла сахарная	Подгрызающие совки		49(2)	7(3)
0,48	Свекла сахарная (семенные посевы)	Тли - переносчики вирусных заболеваний		49(2)	7(3)
0,48	Картофель (семенные посевы)			-(2)	7(3)
0,16	Картофель	Картофельная моль		7(2)	7(3)
0,1-0,16		Колорадский жук, картофельная коровка		7(2)	7(3)
0,32	Соя	Соевая плодожорка, луговой мотылек, многоядный листоед		34(2)	7(3)
0,24	Люцерна	Фитономус		-(2)	7(3)
0,14-0,24	Крестоцветные культуры (семенные посевы)	Рапсовый цветоед		-(3)	7(3)
0,16	Капуста	Белянки, совка, моли		14(3)	7(3)
0,5	Морковь	Морковная муха, морковная листоблошка		7(2)	7(3)
0,1-0,15	Пастбища, дикая растительность	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях не ранее 15 дней после обработки; сбор грибов и ягод после обработок дикой растительности в сезон обработки не допускается. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	7(3)