ГЕРБИЦИДЫ

Альфа-Стар, ВДГ
750 г/кг трибенурон-метила, 0,1 кг

Культура - *Пшеница яровая и озимая, ячмень, подсолнечник*

Вредные объекты - *Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, а также бодяк полевой*

Норма расхода - *0,01-0,02*

Альфа-Бентазон, ВР
480 г/л бентазона, 20 л.

Культура - *Пшеница яровая и озимая, рожь, ячмень, овес, горох, соя, люцерна, клевер*

Вредные объекты - *Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, сорняки*

Норма расхода - *1,5-4,0*

Альфа-Прометрин, КС
500 г/л прометрина, 5л

Культура - *Картофель, кукуруза, подсолнечник, морковь*

Вредные объекты - *Однолетние двудольные и злаковые сорняки*

Норма расхода - 1,5-3,5

Альфа-Гард, ВДГ
750 г/кг тифенсульфурон-метила. 0,1 кг

Культура - *Кукуруза, соя, лен долгунец, лен масличный, пшеница яровая и озимая, ячмень*

Вредные объекты - *Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к 2,4-Д и триазинам*

Норма расхода - 0,006-0,025

Альфа-Бригадир, КЭ
71 г/л десмедифама+91 г/л фенмедифама+112 г/л этафумезата, 5 л.

Культура - *Свекла сахарная, столовая, кормовая*

Вредные объекты - *Однолетние двудольные в т.ч. виды щирицы и подмаренник цепкий, и некоторые однолетние злаковые сорняки*

Норма расхода - 1,0-3,0

ГЕРБИЦИДЫ

Галмет, КЭ

104 г/л галоксифоп-Р-метила, 5л

Культура - *Свёкла сахарная, подсолнечник, соя, рапс*

Вредные объекты - *Однолетние злаковые (виды щетинника, просо куриное), многолетние злаковые*

Норма применения препарата	Культура, обрабатываемый объект	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных работ)
0,5	Свекла сахарная, подсолнечник, рапс	Однолетние злаковые сорняки (виды щетинника, просо куриное, просо сорнополевое)	Опрыскивание сорняков в период их активного роста (в фазе от 2-6 листьев до кущения). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60(1)	-(3)
0,5	Свекла кормовая	Однолетние злаковые сорняки (виды щетинника, просо куриное, просо сорнополевое)	Опрыскивание сорняков в период их активного роста (в фазе от 2-6 листьев до кущения). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	-(1)	-(3)
1	Свекла сахарная, подсолнечник, рапс	Многолетние злаковые сорняки (пырей ползучий, гумай, свинорой)	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60(1)	-(3)
1	Лен-долгунец	Многолетние злаковые сорняки (пырей ползучий, гумай, свинорой)	Опрыскивание посевов при высоте льна 12-18 см в период активного роста сорняков. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	-(1)	-(3)

ГЕРБИЦИДЫ

Гренч, СП

600 г/кг метсульфурон-метила, 0,05кг

Культура - *Пшеница яровая, озимая, ячмень яровой*

Вредные объекты - *Однолетние двудольные сорняки в т.ч. устойчив. к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки (бодяк и пр.)*

Норма расхода - *0,005-0,01*

Девиз, ВР

480 г/л дикамбы к-ты, 5л

Культура - *Пшеница, ячмень, рожь яровые и озимые*

Вредные объекты - *Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые мног.двудольные сорняки, вкл. виды осота, бодяк*

Норма расхода - *0,15-0,3*

Коррида, ВДГ

750 г/кг трибенурон-метила, 0,1 кг

Культура - *Пшеница яровая и озимая, ячмень, подсолнечник по системе Экспресс*

Вредные объекты - *Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, а также бодяк полевой*

Норма расхода - *0,01-0,02*

ГЕРБИЦИДЫ

Меридиан, ВР

267 г/л клопиралида+67 г/л пиклорама, 5л

Культура - *Рапс яровой и озимый*

Вредные объекты - *Однолетние и многолетние двудольные сорняки, в том числе подмаренник цепкий, виды ромашки, горца, щирицы, мари, гречишка вьюнковая, виды бодяка и осота*

Норма применения препарата	Культура, обрабатываемый объект	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных работ)
0,3-0,35	Рапс яровой и озимый	Однолетние и многолетние двудольные сорняки, в т.ч. подмаренник цепкий, виды ромашки, горца, щирицы, мари, гречишка вьюнковая, виды бодяка и осота и другие	Опрыскивание сорняков в период их активного роста (в фазе от 2-6 листьев до кущения). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60(1)	-(3)

ГЕРБИЦИДЫ

Октапон экстра, КЭ

500 г/л 2,4-Д в виде малолетучих эфиров С7-С9, 20л

Культура - *Пшеница озимая, рожь, пшеница яровая, ячмень, кукуруза*

Вредные объекты - *Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки*

Норма применения препарата	Культура, обрабатываемый объект	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных работ)
0,6-0,8	Пшеница озимая, рожь	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов рано весной в фазе кущения культуры. Расход рабочей жидкости - 50-150 л/га	60(1)	-(3)
0,6-0,8	Пшеница яровая, ячмень		Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры. Расход рабочей жидкости - 50-150 л/га	60(1)	-(3)
0,6-0,75	Кукуруза		Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 50-150 л/га	60(1)	-(3)
0,6-0,8	Тимофеевка луговая, райграс высокий, овсяница луговая		Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев до выхода в трубку. Расход рабочей жидкости - 50-150 л/га	-(1)	-(3)
0,4-0,8	Ежа сборная, кострец безостый, лисохвост луговой		Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры. Расход рабочей жидкости - 50-150 л/га	-(1)	-(3)

ГЕРБИЦИДЫ

Оцелот Плюс, МКС

69 г/л феноксапроп-П-этила+ 34,5 г/л антидота, 5л

Культура - *Пшеница озимая, яровая, ячмень яровой*

Вредные объекты - *Однолетние злаковые сорняки, включая овсюг, виды щетинника, просо куриное*

Норма применения препарата	Культура, обрабатываемый объект	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных работ)
0,8-1	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	Однолетние злаковые сорняки (виды щетинника, просо куриное, просо сорно-полевое, овсюг, метлица полевая)	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) сорняков независимо от фазы развития культуры (с учетом чувствительности сортов). Озимая пшеница обрабатывается весной.	60(1)	-(3)

ГЕРБИЦИДЫ

Прима, СЭ

300г/л 2,4-Д кислоты+6,25 г/л флорасулама, 10л

Культура - *Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой*

Вредные объекты - *Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА*

Норма применения препарата	Культура, обрабатываемый объект	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных работ)
0,4-0,6	Пшеница яровая и озимая, рожь, ячмень яровой	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Озимые обрабатывают весной. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(4)
0,6	Пшеница яровая и озимая, рожь, ячмень яровой		Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорняков (с учетом чувствительности сортов) в случае преобладания подмаренника цепкого; если погодные условия не позволили произвести обработку раньше этого срока. Озимые обрабатывают весной. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га		
0,4-0,6	Кукуруза		Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га		
0,5-0,6	Кукуруза		Опрыскивание посевов в фазе 5-7 листьев культуры в случае преобладания подмаренника цепкого; если погодные условия не позволили произвести обработку раньше этого срока. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га		

ГЕРБИЦИДЫ

Риманол, ВДГ

римсульфурон, 250 г/кг, 0,5кг

Культура - *Кукуруза*

Вредные объекты - *Однолетние злаковые и двудольные сорняки, многолетние (пырей)*

Норма применения препарата	Культура, обрабатываемый объект	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных работ)
0,04	Кукуруза	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков в смеси с 200 мл/га ПАВ Дар-90, Ж. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)
0,05	Кукуруза	Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры при высоте злаковых сорняков 10-15 см и в фазе розетки осотов в смеси с 200 мл/га ПАВ Дар-90, Ж. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)
0,03+0,02	Кукуруза	Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры. Двукратное дробное опрыскивание по первой и второй волне сорняков (интервал 10-20 дней) в смеси с 200 мл/га ПАВ Дар-90, Ж. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)
0,05	Картофель	Многолетние (пырей ползучий), однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	Опрыскивание посадок после окучивания в ранние фазы развития (1-4 листа) однолетних сорняков и при высоте пырея 10-15 см в смеси с 200 мл/га ПАВ Дар-90, Ж. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	50(1)	-(3)
0,03+0,02	Картофель		Опрыскивание посадок после окучивания по первой волне и повторно по второй волне сорняков, при высоте пырея 10-15 см в смеси с 200 мл/га ПАВ Дар-90, Ж (отдельно для каждой обработки). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	50(2)	-(3)

ГЕРБИЦИДЫ

Рондо/Легат, КЭ

240г/л клетодима, 5л

Культура - *Свекла сахарная, соя, подсолнечник, лук*

Вредные объекты - *Однолетние, многолетние злаковые (пырей ползучий) сорняки*

Норма применения препарата	Культура, обрабатываемый объект	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных работ)
0,2-0,4	Свекла сахарная и кормовая, подсолнечник, соя	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев у сорняков независимо от фазы развития культуры совместно с Хелпер, КС (ПАВ) 0,6-1,2 л/га. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60(1)	-(3)
0,2-0,4	Лен- долгунец	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев у сорняков независимо от фазы развития культуры совместно с Хелпер, КС (ПАВ) 0,6-1,2 л/га. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	-(1)	-(3)
0,7-1	Свекла сахарная и кормовая, подсолнечник, соя	Многолетние злаковые сорняки (пырей ползучий)	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-20 см независимо от фазы развития культуры совместно с Хелпер, КС (ПАВ) 2,1-3,0 л/га. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60(1)	-(3)
0,7-1	Лен долгунец	Многолетние злаковые сорняки (пырей ползучий)	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-20 см независимо от фазы развития культуры совместно с Хелпер, КС (ПАВ) 2,1-3,0 л/га. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	-(1)	-(3)

ГЕРБИЦИДЫ

Скорпио Супер, КЭ

100г/л феноксапроп-П-этила+27г/л клоквинтосет-мексил, 5л

Культура - *Пшеница яровая и озимая*

Вредные объекты - *Однолетние злаковые сорняки, включая овсюг, виды щетинника, просо куриное*

Норма применения препарата	Культура, обрабатываемый объект	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных работ)
0,4-0,6	Пшеница яровая	Однолетние злаковые сорняки (виды щетинника, просо куриное, просо сорно-полевое)	Опрыскивание в ранние фазы развития (2-3 листа) сорняков независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости – 150-200 л/га	60(1)	-(3)
0,5-0,7	Пшеница яровая	Овсюг	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) сорняков независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости – 150-200 л/га		
0,6-0,9	Пшеница яровая	Однолетние злаковые сорняки (овсюг, щетинники, просо куриное)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2-х листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры). При использовании максимальной нормы применения гербицида на селекционных и семеноводческих посевах пшеницы учитывать устойчивость сортов. Расход рабочей жидкости – 150-200 л/га		
0,6-0,75	Пшеница озимая	Однолетние злаковые сорняки (овсюг, метлица щетинники, просовидные	Опрыскивание посевов весной по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2-х листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости – 150-200 л/га		

ГЕРБИЦИДЫ

Сотейра, ВРК

33 г/л имазамокса+ 15 имазапира, 5л

Культура - *Подсолнечник*

Вредные объекты - *Двудольные и злаковые сорняки, в том числе – заразиха*

Норма применения препарата	Культура, обрабатываемый объект	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных работ)
1-1,2	Подсолнечник (сорта и гибриды, устойчивые к имидазолинонам)	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (2-4 листьев) и 4-5 настоящих листьев у культуры. Ограничения по севообороту: можно высевать пшеницу, рожь не менее, чем через 4 месяца; люцерну, сою, ячмень, овес, кукурузу, горох-через 9 месяцев. Картофель, томаты, табак, лук, просо, салат, подсолнечник, огурцы, морковь можно высевать через 19 месяцев, сахарную и столовую свеклу, рапс – через 26 месяцев. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60(1)	-(3)
2	Земли несесельскохозяйственного назначения	Борщевик Сосновского	Опрыскивание участков засоренных борщевиком Сосновского при его высоте 10-15 см. Расход рабочей жидкости – 300 л/га		
2	Земли несесельскохозяйственного назначения	Амброзия полыннолистная	Опрыскивание участков засоренных амброзией полыннолистной в фазу всходов и до высоты 10-15 см. Расход рабочей жидкости – 300 л/га		

ГЕРБИЦИДЫ

Тапир, ВК

100г/л имазетапира, 10л

Культура - *Соя, горох овощной*

Вредные объекты - *Однолетние и многолетние злаковые и однолетние двудольные сорняки, в т.ч. виды амброзии*

Норма применения препарата	Культура, обрабатываемый объект	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных работ)
0,5-0,8	Соя	Однолетние и многолетние злаковые и однолетние двудольные сорняки, в т.ч. виды амброзии	Опрыскивание почвы до посева (с заделкой), до всходов или опрыскивание посевов в фазе всходов - двух тройчатых листьев культуры. Ограничения по севообороту: при пересеве в год применения рекомендуется высевать озимую пшеницу, на следующий год - кукурузу, яровые и озимые зерновые, через два года - все культуры без ограничений. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)
0,5-0,7	Горох на зерно	Однолетние и многолетние злаковые и однолетние двудольные сорняки, в т.ч. виды амброзии	Опрыскивание почвы в течение 2-3 дней после посева или опрыскивание вегетирующих растений в фазе 3-6 листьев культуры. Ограничения по севообороту: при пересеве в год применения рекомендуется высевать озимую пшеницу, на следующий год - кукурузу, яровые и озимые зерновые, через два года - все культуры без ограничений. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	27(1)	-(3)

ГЕРБИЦИДЫ

Торero, КС

600 г/л метрибузина, 5 л

Культура - *Картофель (кроме раннеспелых сортов), соя, кукуруза*

Вредные объекты - *Однолетние двудольные и злаковые сорняки*

Норма применения препарата	Культура, обрабатываемый объект	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных работ)
0,5-1,1	Картофель	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 200 – 300 л/га	60(1)	-(3)
0,6 - 1	Соя		Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 200 – 300 л/га		
0,8-1	Кукуруза (на зерно)		Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 200 – 300 л/га		
0,5+ 0,3-0,5	Кукуруза (на зерно)		Опрыскивание до всходов культуры и повторно в фазе 3-4 листьев культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га		

ГЕРБИЦИДЫ

Террагард, СЭ

312,5 г/л с-металохлора+187,5 г/л тербутилазина

Культура - *Подсолнечник, кукуруза*

Вредные объекты - *Однолетние злаковые и двудольные сорняки*

Норма применения препарата	Культура, обрабатываемый объект	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных работ)
3-4	Подсолнечник	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культурных растений. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60(1)	-(3)
3-4	Кукуруза	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов до появления всходов или после всходов культуры (до фазы 3-го листа). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60(1)	-(3)

ГЕРБИЦИДЫ

Хантер, КЭ

51,6 г/л хизалофоп-П-этила, 5л

Культура - *Свекла сахарная, соя, подсолнечник, картофель*

Вредные объекты - *Однолетние и многолетние злаковые сорняки, в т.ч. пырей ползучий*

Норма применения препарата	Культура, обрабатываемый объект	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных работ)
1-2	Свекла сахарная, соя, подсолнечник	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков. Расход рабочего раствора - 200-300 л/га	60(1)	-(3)
2-3	Свекла сахарная, соя, подсолнечник	Многолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов при высоте сорняков 10-15 см. Расход рабочего раствора - 200-300 л/га	60(1)	-(3)
2-3	Лен-долгунец	Многолетние и однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе “елочки” культуры (при высоте пырея ползучего 10-15 см). Расход рабочего раствора - 200-300 л/га	-(1)	-(3)
2-4	Картофель	Однолетние и многолетние злаковые сорняки, в т.ч. пырей ползучий	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев у однолетних сорняков и высоте пырея 10-15 см. Расход рабочего раствора - 200-300 л/га	60(1)	-(3)

ГЕРБИЦИДЫ

Чисталан экстра, КЭ

420г/л 2,4-Д эфира+60г/л дикамбы (натриевая соль), 20 л

Культура - *Пшеница яровая, озимая, рожь, ячмень, овес, кукуруза, просо*

Вредные объекты - *Однольные и двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки (бодяк и др)*

Норма применения препарата	Культура, обрабатываемый объект	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных работ)
0,67-0,9	Пшеница яровая, озимая, рожь, ячмень	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку. Озимые обрабатываются весной. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	55(1)	-(3)
0,67-0,8	Овес		Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	55(1)	-(3)
0,67-0,9	Кукуруза		Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	60(1)	-(3)

ГЕРБИЦИДЫ

Элант Экстра, СЭ

410г/л 2,4-Д кислоты+7,4 г/л флорасулама, 10л

Культура - *Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой*

Вредные объекты - *Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА*

Норма применения препарата	Культура, обрабатываемый объект	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных работ)
0,3-0,5	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	Однолетние двудольные (в т. ч. подмаренник цепкий и устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х-кислотам) и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Озимые обрабатываются весной. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га	60(1)	-(-)
0,5	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой		Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорняков (с учетом чувствительности сортов) в случае преобладания подмаренника цепкого; если погодные условия не позволили произвести обработку раньше срока. Озимые обрабатывают весной. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га		
0,3-0,5	Кукуруза (в том числе на силос и масло)	Однолетние двудольные (в т. ч. подмаренник цепкий и устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х-кислотам)	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га		
0,3-0,5	Просо		Опрыскивание посевов в фазе 3-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га		
0,3-0,5	Сорго		Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га		

ГЕРБИЦИДЫ

Эфилон, КЭ

450г/л клопиралида, 5л

Культура - *Пшеница яровая и озимая, ячмень, овес, свекла сахарная*

Вредные объекты - *Виды ромашки, горца, осота*

Норма применения препарата	Культура, обрабатываемый объект	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных работ)
0,1-0,2	Свекла сахарная	Виды ромашки, горца, латука, осота, бодяка	Опрыскивание посевов в фазе 1-3 пар листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)

ГЕРБИЦИДЫ

Юнкер, ВР

40 г/л имазамокса, 5л

Культура - *Соя, горох*

Вредные объекты - *Однолетние злаковые и двудольные сорняки*

Норма применения препарата	Культура, обрабатываемый объект	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных работ)
0,75-1	Соя	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (1-3 настоящих листа) и 1-3 настоящих листа культуры. На следующий год можно высевать все культуры, кроме сахарной свеклы (безопасный интервал между применением гербицида и посевом свеклы – 16 месяцев). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60(1)	-(3)
0,75-1	Горох и нут (при выращивании на зерно)	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (1-3 настоящих листа) и 1-3 настоящих листа культуры. На следующий год можно высевать все культуры, кроме сахарной свеклы (безопасный интервал между применением гербицида и посевом свеклы – 16 месяцев). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	53(1)	-(3)