УДОБРЕНИЯ

Сухие водорастворимые комплексные минеральные удобрения

Производитель HUMINTECH GmbH (Германия)

Наименование продукции	Состав препарата	Норма расхода	Применение	Эффект
ФУЛЬВИТАЛ ПЛЮС, 1.5 кг	750 г/кг фульвовых кислот; Fe-40г/кг; Zn-25г/кг; Mn-25г/кг; Cu-10г/кг; Mg-70г/кг; S-60г/кг, pH 3,0	0,2 кг/тн	для предпосевной обработки семян	- Оказывает растворяющее действие на минеральные соединения, делая их доступными в почве для растений - Стимулирует быстрое нарастание вегетативной массы; - Повышает полевую всхожесть обработанных семян; - Стимулирует рост и развитие корневой системы; - Восстанавливает после гербицидных стрессов; - Усиливает естественный иммунитет растений.
		0,1-0,15 кг/га	для внекорневых подкормок	
Фульвигрейн Классик, ВС	160 г/л гуминовых кислот, 40 г/л фульвовых кислот, pH 9-10,5	0,8 л/тн	для предпосевной обработки семян	- Профилактика стрессов, стимуляция физиологических процессов. - Стимулирует рост корневой системы. - Уменьшает воздействие стрессов различного происхождения.
		0,2-0,4 л/га	для внекорневых подкормок	
Фульвигрейн Сид, ВС	120 г/л гуминовых кислот, 60 г/л экстракт морских водорослей, pH 5,5-7,5	0,5-1,0	для предпосевной обработки семян	- Ускоряет прорастание семян в неблагоприятных условиях. - Стимулирует рост корневой системы. - Повышает всасывающую способность корневых волосков.
		0,2-0,4	для внекорневых подкормок	
Фульвигрейн Стимул, ВС	200 г/л фульвовых кислот; Fe-14г/л; Zn-9 г/л; Mn-7 г/л; Cu-5 г/л; Mg-21г/л; S-15г/л, pH 3-4	0,3-0,5 л/га	для внекорневых подкормок	- Улучшает и ускоряет усвоение элементов питания из почвы; - Стимулирует быстрое нарастание вегетативной массы; - Усиливает природный иммунитет растений.
Фульвигрейн Старт, ВС	120 г/л гуминовых, 60 г/л фульвовых кислот, pH 6-7,5	0,2-0,4 л/га		- Стимулирует восстановление и возобновление вегетации озимых культур; - Повышает устойчивость к стрессовым колебаниям температур; - Стимулирует кущение и ветвление.
Фульвигрейн Антистресс,ВС	100 г/л гуминовых кислот, 20 г/л фульвовых кислот, 60 г/л аминокислоты, pH 6-7,5	0,2-0,4 л/га		- Восстанавливает растение от стрессов различного происхождения; - Защищает растения от последействия гербицидных обработок; - Усиливает засухоустойчивость.
Фульвигрейн Бор, ВС	80 г/л бора, 100 г/л фульвокислот	0,5-1,5 л/га		- Обеспечивает растения быстродоступным бором - Предотвращает сброс цветков и завязей - Предотвращает гниль сердечка у сахарной свеклы - Повышает усвоение тяжелодоступных элементов питания из почвы

УДОБРЕНИЯ

АМКО

Производитель MCFP (Modern Company For Fertilizer Production) Иордания

Наименование продукции	Состав препарата	Культура	Норма расхода	Применение
Амко Универсал, *мешок 25 кг*	%: NPK (20:20:20), MgO-0,6; Mn-0,05; Fe-0,05; B-0,01.	Овощи открытого и закрытого грунта	1-2 кг/га Расход рабочего раствора 200-500 л/га	Некорневая подкормка 1-3 раза в течение вегетационного периода
		Полевые культуры	1 кг/га Расход рабочего раствора 200-500 л/га	
		Плодовые культуры	2-3 кг/га	1-я обработка до раскрытия плодовой почки (2 кг/га) 2-я обработка после цветения (3 кг/га)
Амко Универсал, *мешок-10 кг*		Кормовые культуры	1 кг/га Расход рабочего раствора 200-500 л/га	Некорневая подкормка 1-3 раза в течение вегетационного периода
		Декоративные культуры	3 кг/га	Перед цветением (3 кг/га), цветение и вегетация (1 кг/га) с инт. 1 неделя
Амко Рост, *мешок 25 кг*	%: NPK (10:50:10), MgO-0,6; Mn-0,05; Fe-0,05; B-0,01; Zn-0,019.	Овощи открытого и закрытого грунта	1-1,5 кг/га Расход рабочего раствора 200-500 л/га	Некорневая подкормка 1-3 раза в течение вегетационного преиода
		Полевые культуры	1 кг/га Расход рабочего раствора 200-500 л/га	
		Плодовые культуры	1-2 кг/га	Двукратная обработка в ранний послеуборочный период с инт. 7-10 дней
		Кормовые культуры	1 кг/га Расход рабочего раствора 200-500 л/га	Некорневая подкормка 1-3 раза в течение вегетационного преиода
		Декор. культуры	1-2 кг/га	Подкормка в период возобн. вегетации
Амко Урожай, *мешок 25 кг*	%: NPK (12:12:36), MgO-0,6; Mn-0,05; Fe-0,05; B-0,01; Zn-0,019.	Овощи открытого и закрытого грунта	1-1,5 кг/га Расход рабочего раствора 200-500 л/га	Некорневая подкормка 1-3 раза в течение вегетационного преиода
		Полевые культуры	1 кг/га Расход рабочего раствора 200-500 л/га	
Амко Урожай, *мешок 10 кг*		Кормовые культуры	1 кг/га	
		Плодовые культуры	1-3 кг/га	Двукратная обработка в период созревания плодов Виноградники - обработка в фазу активного роста ягод
Амко Бор, *мешок 20 кг*	%: B-11, MgO-3,0; Mn-3,0; Fe-0,05; SO3-10, pH активный комплекс.	Кукуруза	0,5-1 кг/га Расход рабочего раствора 200-500 л/га	Некорн. подкормка в фазу 3-5 листьев
		Подсолнечник		Некорн. подкормка в фазу 7-10 листьев
		Соя		Некорн. подкормка в фазу бутонизации
		Рапс озимый		Некорн. подкормка в фазу стеблевания
		Сахарная свекла		Некорн. подкорм. в фазу смык. листьев
		Горох		Некорневая подкормка в фазу бутонизации
		Томаты, перец, баклаж.		
		Огурцы		Некорн. подкормка перед цветением
		Капуста		Некорн. подкормка в фазу начала формирования головки
		Картофель		Некорневая подкормка в фазу начала формирования клубней
		Арбуз, дыня, тыква		Некорн. подкормка в фазу бутонизации
Амко Зерно, *мешок 20 кг*	%: N-5,0; MgO-5,0; Cu-2,0; Mn-2,0; SO3-6,0.	Озимые зерновые	2 кг/га. Расход рабочего раствора 200-500 л/га	Некорневая подкормка в фазу кущения-выхода в трубку (весна)
Амко Кукуруза, *мешок 20 кг*	%: N-4,0; Mn-5,0; SO3-13; Zn-5,0.	Кукуруза	1-2 кг/га Расход рабочего раствора 200-500 л/га	Некорневая подкормка в фазу 6-8 листьев

УДОБРЕНИЯ

BATR

Наименование продукции	Состав препарата	Норма расхода	Применение	Эффект
Batr Gum, *10л*	%: B-0,18; Mo-0,05; SO3-1,2; Mgo-0,5; Zn-0,05; Cu-0,05; Fe-0,02; Mn-0,05; Co-0,005. Полигидроксикарбоновые кислоты-40	0,2-0,5	Для предпосевного протравливания семян и клубней	-Увеличивает энергию прорастания и всхожесть семян -Стимулирует развитие корневой системы -Повышает морозо-и засухоустойчивость Проявляется « озеленяющий»эффект -Наиболее экономичное удобрение в антистрессовой технологии выращивания культур -Быстро и эффективно восполняет дефицит микроэлементов
		0,2-0,3	Для внекорневой обработки	
Batr 40N, *10л*	%: N-40; SO3-4,1;Mgo-0,32; B-0,026; Zn-0,15; Cu-0,06; Fe-0,04; Mn-0,06; Mo-0,013; Co-0,01.	2,0-3,0		-Хороший «инструмент», позволяющий оптимизировать питание растений в критические и стрессовые периоды развития растений -Ускоряет процессы роста и развития растений -Увеличивает содержание сахара в корнеплодах сахарной свеклы и крахмала в клубнях картофеля -У зерновых повышает клейковину зерна и выполненность колоса.
Batr Max, *10л*	%: N-6; P2O5-7; K20-10; SO3-2,8; Mg-0,18; Zn-0,06; Cu-0,06; B-0,02; Fe-0,025; Mn-0,06; Co-0,01.	0,2-1,0		-Предотвращает дефицит азота, фосфора и калия -Наличие макроэлементов повышает эффективность от применения микроэлементов -Усиливает сопротивляемость растений к заморозкам, засухам, пестицидным нагрузкам, вредным биологическим объектам и т.д. -Улучшает качество продукции -Повышает устойчивость к полеганию.
Batr Bor, *10л*	%: B-13; N-6; SO3-0,4; Mgo-0,06; Zn-0,026; Cu-0,026; Fe-0,04; Mn-0,026; Mo-0,06; Co-0,01.	0,5-1,0		-Эффективное удобрение, предотвращающие появление дефицита бора -Стимулирует образование клубеньков у бобовых -Повышает количество цветков и плодов, уменьшает количество пустоцвета, препятствует опаданию завязи -Состав удобрения оптимально сбалансирован
Batr S, *10л*	%: SO3-25; N-8,0; MgO-1.	1,0-3,0		- Повышает урожай и качество сельскохозяйственных культур, особенно технических - Повышает устойчивость к погодным стрессам - Повышает устойчивость к грибковым болезням растений
Batr Zn, *10л*	%: Zn-6,0; SO3-8,6; N-3,0	0,5-1,0		- Повышает урожай с/х культур, особенно кукурузы, сахарной свеклы, картофеля и бобовых - Один из сильно необходимых микроэлементов почвы - Повышает устойчивость к засухе и воздействию низких температур - Повышает устойчивость к заболеваниям
Batr Mo, *10л*	%: Mo-8,0; N-4,0	0,2-1,0		- Повышает урожай с/х культур, особенно зернобобовых, технических, кормовых культур, овощные - Один из сильно необходимых микроэлементов почвы - Усиливает азотный, углеводный и фосфорный обмен. - На кислых и бедных Mo почвах высокоэффективен на зерновых культурах
Batr Cu, *10л*	%: Cu-6; SO3-7,8; N-3,0	0,5-1,0		- Повышает устойчивость к засухе и воздействию низких температур - Повышает устойчивость к грибным заболеваниям - Повышает прочность стеблей зерновых культур - Повышает содержание белка и клейковины в зерне, сахара в корнеплодах сахарной свеклы, крахмала — в клубнях картофеля